

STREPTOKOKNE BOLESTI (šarlah i gnojna angina)

Šarlah i gnojne angine su bolesti izazvane Streptokokom iz grupe A. Lečenje se sprovodi antibioticima a zaraznost prestaje posle 24 sata od početka terapije. Nelečene bolesti mogu dati ozbiljne komplikacije.



KOJI SU SIMPTOMI?


Gnojna angina: Povišena telesna temperatura, jeza, povraćanje, gušobolja i bol u trbuhi. **Kod šarlaха** se javlja i karakterističan **crveni osip** po koži koji na dodir podseća na brusni papir (**šmirgla**). Osip se prvo javilja na vratu, u pazušnoj jami i na preponama. Iako obrazi budu crveni, oko usta može da se javi bledilo. Pazuh, lakan i prepone postaju svetlijе crvene boje od ostatka osipa. Nakon povlačenja osipa, koža na jagodicama prstiju ruku i nogu se peruta i ljušti. Jezik je malinaste boje i može biti obložen.

ŠTA AKO VAŠE DETE DOBIJE ŠARLAH ILI GNOJNU ANGINU?

LEČENJE Ako se dete razboli odvedite ga pedijatru koje će mu prepisati odgovarajući antibiotik. Terapija sprečava većinu komplikacija i skraćuje zaraznost.



Dete sa šarlahom ili gnojnom anginom **ne treba da ide u vrtić ili školu** minimum 24 časa nakon započinjanja antibiotske terapije. Preporuka je da se dete vrati u kolektiv tek kada se oporavi, po završetku lečenja koje traje 10 dana.



Često PRANJE RUKU VODOM I TEĆNIM SAPUNOM pod nadzorom roditelja.

Prilikom kijanja nos i usta pokriti papirnom maramicom.

HIGIJENA prostora: vlažno čišćenje, pranje i dezinfekcija prostorija, posebno stolova, stolica, ručki, igračaka, kvaka.

Obolelo dete u periodu zaraznosti treba da ima svoj pribor za jelo, pribor za ličnu higijenu, peškir i posteljinu.



ИНСТИТУТ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ